

1	Alle Blüten des Korbs röhrenförmig oder nur die randlichen Blüten zungenförmig dann Zungenblüten dreizählig	2
1*	Alle Blüten zungenförmig und fünfzählig; Pflanze meist mit Milchsaf	3
2	Zungenblüten fehlend; alle Blüten sind röhrenförmig	8
2*	Korb mit röhren- und zungenförmigen Blüten; Laubblätter unzerseilt	11
3	Alle Laubblätter grundständig	4
3*	gleichmäßig am Stängel verteilt	5
4	Stängel röhrenförmig hohl, völlig ohne Blätter, unverzweigt, mit weißem Milchsaf; Pflanze nur mit einem Blütenkorb; Pappus gestielt, mit einfachen Haaren; Pflanze 5 - 40 cm hoch; Blütezeit von April bis Juni	officinale sect. (Taraxacum)
4*	Stängel gabelig verzweigt, mit mehreren Köben; Pappus sitzend, Blätter tief fiederförmig mit langen, geraden Abschnitten, kahl oder schwach behaart; Korbstiele mit wenigen lanzettlichen, dem Stiel anliegenden schuppenartigen Hochblättern; Zungenblüten goldgelb, auf der Unterseite rötlich gestreift; Pflanze 15 - 45 cm hoch; Blütezeit von Juli bis September; hitzebestent, salztolerant, kalkmeidend (Scorzonoides autumnalis)	Herbst-Schuppen-löwenzahn

Schlüssel E Korbblütler (Asteraceae)

1	Der Blütenstand muss genau untersucht werden:	Schlüssel E (Asteraceae)
1*	Blütenstand anders	2
2	Korbblätter der Blüten mit nur einer einzigen Symmetrieebene (zygomorph), Korbblätter zumindest teilweise unv erwachsen, Fahne, Flügel und Schföichen bildend; Staubblätter und Stempel von Kronblättern eingehüllt (= Schmetterlingsblüte)	Schüssel F (Fabaceae)
2*	Blüte ohne Ähnlichkeit mit einer Schmetterlingsblüte	Schlüssel G

Schlüssel D zum Bestimmen weiterer Hauptgruppen

5	Stängelblätter fast senkrecht stehend (Blattfläche um 90° gedreht), Mittelrippe bestachelt, bläulichgrün; Stängel weißlich; Zungenblüten von Juli bis September (Lactuca serriola)	5*	Pfanze anders	6	Körbe meist 5blütig; Hüllblätter ohne dunkle Punkte; Endlappen der Laubblätter deutlich größer als der größte Seitenlappen, ohne Stacheln; Pflanze 60 - 120 cm hoch; Blütezeit von Juni bis September	Gewöhnlicher Mauerkraut (Mycelis muralis)
6*	Körbe 8-13blütig; Endlappen der Laubblätter meist kleiner als die größten Seitenlappen; Laubblätter stachelig gezähnt; Hüllblätter mit winzigen dunklen Punkten	7	Stängelblätter am Grund mit vorgestreckten, spitzigen Öhrchen, weich, blaugrün, matt, nicht stachelig; untere Stängelblätter fiederspaltig; im Kohl-Gänsedistel (Sonchus oleraceus)	7	Endlappen am breitesten; Zungenblüten hellgelb; Pflanze 30 - 100 cm hoch; Blütezeit von Juni bis Oktober	hoch; Blütezeit von Juni bis Oktober
7*	Stängelblätter mit abgerundeten, am Stängel anliegenden steifen Öhrchen; derb, dunkelgrün, oberseits glänzend, stachelig gewimpert; die unteren Blätter meist unzerteilt, wenn fiederspaltig, dann oberste Seitenlappen breiter als Endlappen; Zungenblüten gelb; Pflanze 30 - 80 cm hoch; Blütezeit von Juni bis Oktober (Sonchus asper)	7*	Stängelblätter mit abgerundeten, am Stängel anliegenden steifen Öhrchen; derb, dunkelgrün, oberseits glänzend, stachelig gewimpert; die unteren Blätter meist unzerteilt, wenn fiederspaltig, dann oberste Seitenlappen breiter als Endlappen; Zungenblüten gelb; Pflanze 30 - 80 cm hoch; Blütezeit von Juni bis Oktober	7*	Blütezeit von Juni bis Oktober	hoch; Blütezeit von Juni bis Oktober
8	Korbboden scheibelförmig flach	8	Korbboden scheibelförmig flach	9		
8*	Korbboden kegelförmig gewölbt; im Inneren hohl; Röhrenblüten grünlich - gelb; Laubblätter kürzer als 5 cm, 2-fach fiederschnittig; Laubblätter gegenseitig, beim Zerreiben nach Kamille riechend; Pflanze 5 - 30 cm hoch; Blütezeit von Juni bis August	8*	Laubblätter gegenseitig, beim Zerreiben nach Kamille riechend; Pflanze 5 - 30 cm hoch; Blütezeit von Juni bis August	9	Pflanze 10 - 30 cm hoch; Blütezeit von Februar bis November	schwarzlich; Laubblätter gelappt bis fiederspaltig, die oberen geöhrt; Krone der Röhrenblüten hellgelb; Außenhüllblätter bis zur Hälfte oder behaart, aber nie stachelig, wenn behaart, dann kurzhaarig
9		9		10	Gewöhnliches Graiskraut (Senecio vulgaris)	Pflanze 10 - 30 cm hoch; Blütezeit von Februar bis November

1	Kronblätter miteinander und mit der Staubadenröhre verwachsen; Kronblätter weiß oder hellrosa, nach dem Verblühen hellbraun; Blüten deutlich gestielt, mehrere einzelne aufrechten Stielen, kugelig ca. 2 cm breit; Stängel weithin kriechend; Pflanze 15 - 50 cm hoch; Blütezeit von Mai bis September	September	Kronblätter gelb, nur miteinander und nicht zusätzlich mit der Staubadenröhre verwachsen; Früchte spirallig eingerollt; Blüten 2-3 mm lang; Köpfchen 10-50blütig; Laubblätter mit kleinen Spitzchen in der Ausrandung; Pflanze 15 - 60 cm hoch; Blütezeit von Mai bis Oktober	1*	Hopfen-Luzerne (Medicago lupulina)
---	---	-----------	---	----	------------------------------------

Schlüssel F Schmetterlingsblütler (Fabaceae)

10*	Krone der Röhrenblüten gelblich oder rotbraun; Hüllblätter flzig behaart; Körbe in reich verzweigter ästiger Rispe, Körbe eiförmig, 3-4 mm lang; Laubblätter oberseits meist dunkelgrün und kahl, unterseits weißflzig, 1mal fiederspaltig, Blattabschnitte breiter als 2 mm, Blattstiel am Grund mit Öhrchen; Blätter zerreiben mit typischem Geruch; Pflanze 60 - 150 cm hoch; Blütezeit von Juli bis November; Geruch: Pflanze 60 - 100 cm hoch; Blütezeit von Juni bis September	11	Zungenblüten kaum länger als Röhrenblüten, Zungenblüten als 100 Körben, Korbestand nicht von Seitenästen überragt; Stängel längs gerippt, zerstreut behaart, dicht beblättert; Pflanze 20 - 100 cm hoch; Blütezeit von Juli bis Oktober	11*	Kanadisches Bernkraut (Conyza canadensis)
11	Zungenblüten fast doppelt bis mehrfach so lang wie die Röhrenblüten, abstehend, schmal (weniger als 1 mm breit), Zungenblüten weiß bis hellviolett; Röhrenblüten gelb; zahlreiche Körbe; endständiger Ast von Seitenästen überragt; Pflanze 50 - 100 cm hoch; Blütezeit von Juni bis September	11*	Zungenblüten kaum länger als Röhrenblüten, Zungenblüten als 100 Körben, Korbestand nicht von Seitenästen überragt; Stängel längs gerippt, zerstreut behaart, dicht beblättert; Pflanze 20 - 100 cm hoch; Blütezeit von Juli bis Oktober	11*	Kanadisches Bernkraut (Conyza canadensis)
11	Zungenblüten fast doppelt bis mehrfach so lang wie die Röhrenblüten, abstehend, schmal (weniger als 1 mm breit), Zungenblüten weiß bis hellviolett; Röhrenblüten gelb; zahlreiche Körbe; endständiger Ast von Seitenästen überragt; Pflanze 50 - 100 cm hoch; Blütezeit von Juni bis September	11	Zungenblüten fast doppelt bis mehrfach so lang wie die Röhrenblüten, abstehend, schmal (weniger als 1 mm breit), Zungenblüten weiß bis hellviolett; Röhrenblüten gelb; zahlreiche Körbe; endständiger Ast von Seitenästen überragt; Pflanze 50 - 100 cm hoch; Blütezeit von Juni bis September	11*	Kanadisches Bernkraut (Conyza canadensis)

1	Pflanze mit grundständiger Blattrosette	2	Pflanze ohne grundständige Blattrosette	1*	Pflanze mit grundständiger Blattrosette
2	Blattspreite der Rosettenblätter ganzrandig, nie fiederspaltig oder gebuchtet	3	Alle Laubblätter fiederförmig, Blütenstand deutlich endständig	2*	Gewöhnliches Hirtentäschel (Capsella bursa-pastoris)
3	Pflanze moosartig klein, liegend, mit zentraler Blattrosette; Laubblätter gegenständig, 0,5-1,5 cm lang, sehr schmal; Kronblätter weiß, hintällig oder fehlend; Pflanze 0,2 - 15 cm hoch; Blütezeit von Mai bis September; Verdrühtungszweiger (procumbens)	3*	Pflanze mit deutlich größeren Laubblättern; Stängel ohne Blätter; Blütenstand in einer endständigen Ähre	4	Spitz-Wegwerc (Plantago lanceolata)
4	Laubblattspreite linear- lanzettlich, mit 3-5 deutlich erkennbaren, annähernd parallel verlaufenden Nerven; Stängel mit Ähre längs gefurcht; dadurch 5kantig; Ähre viel kürzer als der Stängel, kugelig; Staubblätter blassgelb, zur Blütezeit deutlich aus dem Blütenstand herausragend; Kronblätter bräunlich; Pflanze 10 - 50 cm hoch; Blütezeit von Mai bis September	4*	Laubblattspreite eiförmig-elliptisch, etwa so lang wie der Laubblattsitel, mit 5-7 deutlich erkennbaren Blatterven, Stängel ohne Ähre so lange oder kürzer als die Laubblätter; Ähre so lang wie der Stängel, lineal-lanzettlich; Staubblätter schmutziggelb, Kronblätter gelblich; Pflanze 5 - 40 cm hoch; Blütezeit von Juni bis Oktober	5	Pflanze mit Milchsaf
5	Pflanze mit orangefarbigem Milchsaf; Laubblätter unterseits blaugrün, tief fiederförmig; Stängel abstehend weißzottig behaart; Kronblätter gelb; Pflanze 30 - 70 cm hoch; Blütezeit von April bis Oktober; Stickstoffzeiger	6	Pflanze ohne Milchsaf	5*	Pflanze ohne Milchsaf
6*	Pflanze ohne orangefarbigen Milchsaf	7	Pflanze ohne orangefarbigen Milchsaf	6*	Schöllkraut (Chelidonium majus)

Schlüssel G

7*	Stängel verzweigt; Pflanze niederliegend	8
8	Stängel und Frucht kahl; Samen ohne Querrfurchen; Pflanze mit vier grundständigen Sprossachsen; Blattspreite elliptisch, am Rand gesägt, graugrün; Pflanze 1 - 5 cm lang; Blütezeit von Juni bis September	Niederliegende Zwergwolfsmilch (<i>Chamaesyce humifusa</i>)
8*	Stängel und Blätter behaart; Samen mit Querrfurchen; Frucht anliegend behaart; Blattspreite meist mit dunkelpurpurnem Fleck; Pflanze 0,05 - 20 cm lang; Blütezeit von Juni bis September	Gefleckte Zwergwolfsmilch (<i>Chamaesyce maculata</i>)
9	Pflanze dicht am Boden liegend wachsend, höchstens am Ende der Triebe etwas aufsteigend	10
9*	Pflanze +/- aufrecht wachsend, nie ausschließlich niederliegend	14
10	Pflanze frisch gelbgrün; Laubblätter 3-8 mm lang, kahl oder nur etwas gewimpert; Blüten sehr klein, in den Blattachseln der Laubblätter; Kronblätter gelbgrün, daher kaum erkennbar; Pflanze 5 - 30 cm lang; Blütezeit von Mai bis Oktober	Kahles Bruchkraut (<i>Herniaria glabra</i>)
10*	Pflanze dunkelgrün, Stängel evtl. rötlich überlaufen; Laubblätter meist länger als 3-8 mm	11
11	Blätter fleischig dick, kahl, 1-2 cm lang, 0,5-1 cm breit, vorn abgerundet, länglich-keilförmig; Stängel oft rot überlaufen; Kronblätter gelb, nur wenige mm groß; Pflanze 2 - 30 cm lang; Blütezeit von Juni bis September	Gemüse-Portulak (<i>Portulaca oleracea</i>)
11*	Blätter nicht fleischig dick	12
12	Stängel und Blätter kahl; Laubblätter 1,5-2 cm lang, linealisch-eiförmig, länger als breit; Kronblätter weißlich-rosa; Pflanze 5 - 50 cm lang; Blütezeit von Juni bis November; Trittzeiger, auf verdichteten Böden	Vogelknöterich (<i>Polygonum aviculare</i> s.l.)
12*	Stängel und/ oder Blätter zumindest etwas behaart (Pflanze um ihre Sprossachse drehen und gegen das Licht halten!)	13
13	Blätter 0,5-3 cm lang, kahl, Blattspreite 2-3x so lang wie breit; Stängel auf 1 Längslinie behaart (im Gegenlicht sichtbar), sonst kahl, unten stielrund; Kronblätter weiß, 2-3 mm lang; Pflanze 3 - 40 cm hoch; Blütezeit von Januar bis Dezember	Vogel-Sternmiere (<i>Stellaria media</i>)

13*	Laub- und Kelchblätter mit sehr kurzen Haaren, Laubblätter sitzend, 1 – 2,5 mal so lang wie breit, innere Kelchblätter mit häutigem Rand, dieser 2/3 bis 1mal so breit wie der krautige Mittelstreifen; Kronblätter weiß; Pflanze 3 – 30 cm hoch; Blütezeit von Mai bis September	Quendel-Sandkraut (Arenaria serpyllifolia)
14	Laubblätter ungeteilt	15
14*	Laubblätter geteilt, fiederspaltig oder geschlitzt	17
15	Rand der Laubblätter ganzrandig ohne Einbuchtungen, Blätter gegenständig	16
15*	Rand der Laubblätter buchtig gezähnt; Laubblätter wechselständig, alle Blätter gestielt, am Grunde herzförmig, beim Zerreiben nach Knoblauch riechend; Blüten weiß, Kronblätter 4-5 mm lang, Frucht 4-5 cm lang, schmal vierkantig; Pflanze 20 - 100cm hoch; Blütezeit von April bis Juni	Knoblauchsrauke (Alliaria petiolata)
16	Alle Laubblätter sitzend, gegenständig, 0,5-3 cm lang, kahl, Laubblattspreite 2-3x so lang wie breit; Stängel auf 1 Längslinie behaart (im Gegenlicht sichtbar), sonst kahl; Kronblätter weiß, 2-3 mm lang; Pflanze 3 - 40 cm hoch; Blütezeit von Januar bis Dezember	Vogel-Sternmiere (Stellaria media)
16*	Untere Laubblätter gestielt, obere Laubblätter sitzend, gegenständig, Laubblätter 10-25 mm lang, 3-10 mm breit, behaart; Stängel rundherum mehr oder weniger behaart; Kronblätter weiß, 2-3 mm lang; Pflanze 5 - 50 cm hoch; Blütezeit von April bis Oktober; Lehmzeiger	Gewöhnliches Hornkraut (Cerastium holosteoides)
17	Pflanze mit dreiteiligen, kleeartigen Blättern; Kronblätter gelb, 4-8 mm lang	18 (Sauerklee)
17*	Pflanze mit zusammengesetzten Blättern, diese aber nicht wie ein Kleeblatt aussehend	20
18	Stängel aufrecht; Blätter wechselständig; Blattstiel ohne Nebenblätter; Frucht 8-12 mm lang, locker abstehend behaart ohne kurze awärts gerichtete Haare; Fruchstiele aufrecht-waagrecht abstehend; Pflanze 10 - 40 cm hoch; Blütezeit von Juni bis Oktober	Steifer Sauerklee (Oxalis stricta)
18*	Frucht länger, dicht behaart mit kurzen abwärts gerichteten Haaren; Blattstiel mit Nebenblättern; Fruchstiele zurückgeschlagen	19
19	Stängel aufrecht; Laubblätter gegen- oder quirlständig, grün, Blättchen ¼ bis 1/6 ihrer Länge zweilappig; Pflanze 10 - 40 cm hoch; Blütezeit von Juli bis Oktober	Dillenius-Sauerklee (Oxalis dillenii)

Schlüssel B Ährengräser

1	<u>Blatthäutchen durch einen Haarkranz ersetzt</u> ; Ähren von genau 1 Punkt aus entspringend, handförmig angeordnet; Ährchen ohne Grannen; Pflanze graugrün; mit langen, oberirdischen Ausläufern; Pflanze 20 – 40 cm hoch; Blütezeit von Juli bis September	Gewöhnliches Hundszahn-gras (Cynodon dactylon)
1*	<u>Blatthäutchen</u> häutig oder fehlend, <u>nie in Haare aufgelöst</u>	2
2	Ährchen in mehreren dünnen, fingerförmigen Ähren; Blätter und Blattscheiden oft dicht behaart, Blätter oft blutrot überlaufen; Pflanze 30-90 cm hoch; Blütezeit von Juni bis Oktober	Blutrote Fingerhirse (Digitaria sanguinalis)
2*	Ährchen eine einzige Ähre bildend oder eine Traube mit sehr kurzen Ährchenstielen	3
3	Auf jedem Absatz der Ährchenachse (meist) 3 Ährchen nebeneinander („Ährchendrillinge“); Ährchendrillinge abwechselnd gegenüberstehend, Ährchen meist 6zeilig angeordnet; Ährchen 1-2blütig; Deckspelze am Mittelährchen jedes Drillings lang begrannt; Blätter flach, grasgrün; Blattscheide geöhrt; Pflanze 15 - 40 cm hoch; Blütezeit von Juni bis Oktober	Mäuse-Gerste (Hordeum murinum)
3*	Pflanze anders	4
4	Auf jedem Absatz der Ährenachse nur 1 Ährchen; Ährchen in 2 gegenüberliegenden Zeilen angeordnet, Ährchen mit 1 Hüllspelze; Deckspelze unbegrannt oder grannenspitzig; Ährchen mit der <u>Schmalseite</u> zur Ährenachse gewandt; Halme bis oben hin glatt; Blätter 2-4 mm breit, dunkelgrün; Pflanze 10 -60 cm hoch; Blütezeit von Mai bis Oktober	Deutsches Weidelgras (Lolium perenne)
4*	Ährchen mit 2 Hüllspelzen; Ährchen mit der <u>breiten Seite</u> (Deckspelzenrändern) der Ährenachse zugewandt; Blattgrund mit stängelumfassenden Öhrchen; Laubblattspreite flach, grün oder blau bereift, auf der Oberseite rau; Pflanze 20 - 120 cm hoch; Blütezeit von Juni bis Juli	Gewöhnliche Quecke (Elymus repens)

Schlüssel C Rispengräser

1	<u>Blätter mit kahnförmiger Spitze</u> , 2 parallele, helle Streifen längs der Mittelrippe (<u>Skispur</u>); Blatthäutchen bis 3 mm lang, an Blattscheide herablaufend; Pflanze 2 - 30 cm hoch; Blütezeit von Januar bis Dezember	Einjähriges Rispengras (<i>Poa annua</i>)
1*	Blätter <u>ohne kahnförmige Spitze</u> und <u>ohne Skispur</u>	2
2	Ährchen mit langen Grannen	3
2*	Ährchen ohne Grannen	4
3	Rispe dicht, einseitig überhängend, längster Ast mit 4-8 Ährchen; Stängel unterhalb der Rispe kurzhaarig; Deckspelze 9-13 mm lang; Pflanze 10 - 40 cm hoch; Blütezeit von Mai bis Juni	Dach-Trespe (<i>Bromus tectorum</i>)
3*	Rispe locker, nach allen Seiten ausgebreitet; längster Ast mit 1-4 Ährchen; Stängel meist kahl; Deckspelze 19-22 mm lang; Pflanze 30-60 cm hoch; Blütezeit von Mai bis Juni	Taube Trespe (<i>Bromus sterilis</i>)
4	Blätter weniger als 1 cm breit, am Rand mit einer Reihe warzenförmiger Drüsen, an der Blattscheidenmündung auf beiden Seiten durch lange Haare bärtig; das Blatthäutchen ist in einen Haarkranz aufgelöst; Ährchen zur Blütezeit 1,5-2 mm breit, 10-20blütig; Pflanze 10 - 40 cm hoch; Blütezeit von Juli bis August	Kleines Liebesgras (<i>Eragrostis minor</i>)
4*	Blatthäutchen häutig, ca. 1 mm lang, gestutzt; Rispe auch nach der Blüte ausgebreitet; Ährchen meist rotviolett, unbehaart; Pflanze 20 – 40 cm hoch; Blütezeit von Juni bis August; kalkmeidend	Rotes Straußgras (<i>Agrostis capillaris</i>)

Bestimmungsschlüssel für Pflanzen in Pflasterfugen

Schlüssel A zum Bestimmen der Hauptgruppen

1	Pflanze grasartig	2
1*	Pflanze nicht grasartig	Schlüssel D
2	Stängel ohne Knoten, aufrecht, glatt; 1-4 grundständige Blätter, nur wenig kürzer als der Stängel, glänzend; Pflanze 15-40 cm hoch; Blütezeit von Juni-September	Zarte Binse (<i>Juncus tenuis</i>)
2*	Pflanze anders	3
3	Stängel mit Knoten; nicht nur grundständige Blätter, sondern auch Blätter am Stängel	4
3*	Pflanze anders	Schlüssel D
4	Ährchen ungestielt oder an sehr kurzen unverzweigten Stielen, zu Ähren bzw. ährenförmigen Trauben angeordnet, diese einzeln endständig oder am Ende des Stängels zu mehreren fingerartig angeordnet	Ährengräser (Schlüssel B)
4*	Ährchen in langästiger Rispe oder Traube (Äste können ausgebreitet oder zusammengezogen sein); Spindel und Äste sind zum großen Teil sichtbar und verdecken einander nur wenig.	Rispengräser (Schlüssel C)

19*	Stängel kriechend; Laubblätter wechselständig, purpurbraun, Blättchen ¼ bis ½ ihrer Länge zweilappig; Pflanze 10 - 50 cm hoch; Blütezeit von Juni bis September	Gehörnter Sauerklee (<i>Oxalis corniculata</i>)
20	Pflanze mit gefiederten Blättern	21
20*	Pflanze mit ungefederten, aber zusammengesetzten Blättern; Stängel kriechend, an den Knoten wurzelnd; Grundblätter dreiteilig, mit mehr oder weniger gelappten oder gespaltenen Abschnitten, der mittlere Abschnitt dabei immer deutlich gestielt; Pflanze mit oberirdisch kriechenden Ausläufern; Blüten gelb, 2 -3 cm im Durchmesser; Pflanze 30 – 40 cm hoch; Blütezeit von Mai bis September; Nässezeiger	Kriechender Hahnenfuß (<i>Ranunculus repens</i>)
21	Blüten rosa oder purpurn	22
21*	Blüten gelb	23
22	Pflanze mit 3-5zähligen Blättern, fiederschnittig; Kronblätter purpurfarben, 9-13 mm lang; Blütenstiele drüsenhaarig; Stängel und Laubblätter oft purpurrot überlaufen; Pflanze unangenehm riechend; Pflanze 20 - 40 cm hoch; Blütezeit von Mai bis Oktober	Stinkender Storchschnabel (<i>Geranium robertianum</i>)
22*	Stängel niederliegend bis aufsteigend; Laubblätter gefiedert, im Umriss länglich; Pflanze dicht behaart, aber nicht unangenehm riechend; Blütenstand 3-10blütig, Blüte mit 5-8 Kronblättern, purpurrosa, 12- 17 mm lang; Spaltfrucht, Teilfrucht mit spiralig gewundenem Schnabel; Pflanze 10 – 20 cm hoch, Blütezeit von April bis September; Sandzeiger	Gewöhnlicher Reiherschnabel (<i>Erodium cicutarium</i>)
23	Laubblätter 5zählig, 2 Fiederpaare, 1 großer Endlappen, dieser größer als alle andern Fiederblättchen; 4-6 Kronblätter, diese gelb, 3-7 mm lang; nach dem Verblühen mit klettartigen Früchten; Wurzelstock beim Zerreiben nach Gewürznelken riechend; Pflanze 30 - 120 cm hoch; Blütezeit von Mai bis Oktober	Echte Nelkwurz (<i>Geum urbanum</i>)
23*	Grundblätter mit 7-12 Fiederpaaren; Laubblätter unterseits silbrig-seidig behaart, Oberseite grün; Blüten goldgelb, im Durchmesser 15-20 mm groß, einzeln, lang gestielt an den Knoten langer, kriechender Ausläufer; Pflanze 10 - 20 cm hoch; Blütezeit von Mai bis August	Gänsefingerkraut (<i>Potentilla anserina</i>)